

# ล้วนแพทย์กับการใช้ยาปฏิชีวนะ

แปลและเรียนเรียงโดย

ร.อ. พจน์ นิยรัตน์ สต.บ.

ยาปฏิชีวนะที่รักกันแพร่หลายอยู่ในเวลานี้คือ Tyrothricin, Penicillin, Streptomycin & Dihydrostreptomycin, Bacitracin, Aureomycin, Chloromycetin (Chloramphenicol) และ Terramycin ซึ่งจะได้นำมากล่าวให้ทราบเป็นอย่างๆไป

๑. Tyrothricin ผู้พิพากษานี้คือ René Dubos แห่งสถาบันค้นคว้าฯ ของ Rockefeller เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๓๕ โดยทำมาจาก *Bacillus Brevis* ยาขนาดนี้ไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายได้ในแอลกอฮอล์ และ Propylene Glycol สามารถเก็บไว้ได้ไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะของไร.

ยา Tyrothricin ถ้าฉีดเข้าเส้นโลหิตแม้แท่น้อย ก็จะเป็นพิษแก่ร่างกายได้ยัง bard อาจจะเข้าไปทำลายเมล็ดโลหิตแดงให้สลายตัว (Hemolysis) จะนองกรวใช้ยาน้ำทากายนอกเท่านั้น หรือจะใช้ฉีดเข้าเท้านมก็ได้.

ในอเมริกาได้มีผู้นำยาขนาดนี้ไปใช้รักษาโรคเท้านมอักเสบของโภกนเป็นส่วน

มาก นอกจากนั้นแล้ว ยังนำไปใช้สำหรับรักษาข้อแพลสก์ปรกน์เชื้อ ข้อแพลเรอว์ แพลทาร์ก แพลไฟไหม้ Furunculosis, Osteomyelitis, Cellulitis, etc.

ยาขนาดนี้ในเวลาใช้มักนิยมผสมเป็นยาน้ำ Emulsion และเป็นช่องแค่สำหรับขันเมืองเราแล้ว ข้าพเจ้าคงไม่เคยเห็นหรือทราบว่า มีผู้นำยาขนาดนี้มาใช้ในการรักษาพยาบาลสัตว์เลย หวังว่าท่อไปภายหน้าคงจะแพร่หล่ายกัน.

๒. Penicillin ยาขนาดนี้เพื่องฟูและรักกันแพร่หลาย ก็ไม่แล้วสำหรับชาวไทย เรา ออกหงส์ตัวแพกษ์สาร ฉบับที่ ๓ บท๓ ก็เรื่องลงอยู่แล้วบ่่ายังจะเอียด จึงขอนำมากล่าวแต่โดยย่อๆ บางท่านยังเข้าใจว่า ยาขนาดนี้ใช้ฆ่าแบคทีโรค ไคแทบ ทกชนิด ฉะนั้น พอดีประสาห์โรค อะไร เช้าก็หัน เข้าพง เพนนิชลินไว้ก่อนอื่น ซึ่งบางคราวก็ไม่ผล สัตว์หายวันหายคืน แต่บางครั้งก็ไม่痊วยผลให้แก่ผู้ใช้ ท้องหันไปพึงยาขนาดอื่น ก็จะไป.

ยาเพนนิซิลลิน เม็ดอัดเข้าสูร่างกายแล้ว จะถูกขับออกมากับน้ำสลายที่เวลาอันรวดเร็ว ฉะนั้นจึงทำให้ห้องน้ำกันข้อบาก็ครึ่งในวันหนึ่งๆ เพื่อที่จะให้ยาเข้าโลหิตช้าๆ จึงต้องทำเป็น Procaine Penicillin ผสมในน้ำมันหรือ Aluminum Monostearate ซึ่งใช้ฉีดเข้าเส้นโลหิตโดยตรงไม่ได้.

ขนาดที่ใช้แก่สัตว์อย่างน้อยควรคิดในขนาด ๗,๐๐๐ ยูนิต ต่อน้ำหนักตัว ปอนด์ ทุก๓-๔ ช.ม. ต่อครั้ง (ละลายน้ำกลัน) และถ้าเป็นชนิดน้ำมันแล้ว ควรฉีกทุก๑๒ ช.ม. ต่อครั้ง และถ้าเป็นชนิด Procaine Penicillin ละลายในน้ำมันหรือ Aluminum Monostearate ก็ให้ฉีกทุกๆ ๒-๓ ช.ม. ต่อครั้ง ถ้าใช้ฉีดเข้าเท่านั้นเพื่อรักษาโรคเท่านั้น อักเสบแล้ว ให้ใช้เพียง

๒๕,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ยูนิต ก็พอ.

การให้สัตว์กินยานยังไม่เป็นที่นิยมกัน คงเนื่องจากสัตว์ไม่ค่อยกินในคน การให้ยาเกินขนาด ก็ไม่ปรากฏว่ามีพิษแต่อย่างใด.

โรคต่างๆ ที่ปรากฏว่ายาเพนนิซิลลินให้ผลดี ก็คือ โรคแอนแทรกซ์ โรคเท้านม อักเสบ โรคไข้หวัดใหญ่ของม้า โรคเมืองกรุงชุมชนค่า โรคปอดอักเสบ เยื่อบุช่อง

ห้อง อักเสบ Osteomyelitis, Leptospirosis โรคไข้หัด (ชนิด Bacterial) ของสุนัข และแมว โรคไข้อกเสบ โรคไฟฟามทุ่งสุกร และโรคมะเร็งกระดูกช้าง นอกจากข้าพเจ้ายังได้ทราบว่า ไก่มีผู้นำขานี้ไปฉีกรักษาโรคไข้ไข้ไข้ โรคปีก และเท้าเบื้องมาแล้ว หลายราย ปรากฏว่าสัตว์นั้นๆ ได้หายจากการร้ายที่กล่าวแล้วโดยเร็ววัน.

ยาเพนนิซิลลินที่ซื้อขายกันอยู่ในท้องตลาดจะแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ ผสมกับน้ำมันและของ Procaine penicillin in Oil, Procaine Penicillin ใน Aqueous Suspension, Procaine penicillin ใน Aluminum Monostearate, Penicillin ชนิดเม็ด Penicillin bougies.

๓. Streptomycin และ Dihydrostreptomycin ผู้พิพากษา Dr. S. Waksman ซึ่งกำกับมาจากการ Streptomyces Griseus เมื่อปีค.ศ. ๑๙๔๕ ของอเมริกาสามารถผลิตยานี้ได้ประมาณ ๕๘ ตัน ยาทั้งสองชนิดเข้าสู่กระแสโลหิตช้าๆ หรือให้ขับออกจากร่างกายช้าๆ ยังไม่มีผู้ใดคิดคันสำเร็จ การใช้ยานี้รักษาโรคโดยมาก มักนิยมฉีดเข้ากล้ามเนื้อและให้

กินทางปาก เพื่อทำลายเชื้อโรคในกระเพาะอาหารและลำไส้ ยาทงสองชนิดเข้าสู่กระเพาะโดยที่ไม่ได้คุ้ยการให้กินเข้าไปทางปาก ขนาดที่ให้สูน้ำกินเพื่อทำลายเชื้อโรคในลำไส้และกระเพาะนั้น ควรให้กินครั้งละประมาณ ๑/๒—๑ กรัม วันละ ๒ เวลา.

ยาทงสองชนานนี้ ใช้สำหรับรักษาโรคขันเนองมากเชื้อ กรัม — หรือกรัม + บางชนิดที่ใช้เพนนิซิลินรักษาไม่ได้ผล เช่นเชื้อ *Escherichia coli* ที่ทำให้สูน้ำ เป็นโรค Peritonitis โรคบีบสูน้ำขันเนอง จากราชเชื้อ *Proteus* และ *Borrelia* โรคไข้หัด สันข์ทมเชื้อกรัม — ปนอยู่ด้วย โรคปอด อักเสบของถุงโภคที่เนอง จากราชเชื้อกรัม — โรคเท้านม อักเสบในโภคที่เนอง จากราชเชื้อ *Acidobacterium Aerogenes* และ *E. coli* โรค Navel ill ที่เกิดจากเชื้อ *Shigella Equirulis* ในลูกน้ำ, โรค *Erysipelothrix Rhusiopathiae* ในไก่งวง โรค Leptospirosis ในสูน้ำ สำหรับโรคมะเร็งกระเพาะสังคังในโภค ถ้าได้ใช้ยาสีสีเทรีบโภคไม่ชนิดครอบฯ บริเวณที่บวมหรือท Philippides แล้วจะระงับการอักเสบได้.

เนื่องจากยานานนี้ ในประเทศไทยเรายังมีราคางบประมาณมาก ฉะนั้นจึงไม่เหมาะสมสำหรับ

ใช้ทำการรักษาพยาบาล แต่ถ้าเจ้าของสัตว์เป็นผู้มีฐานะคุ้มเสี่ยงเท่าไรเท่ากัน แล้ว ก็พอที่จะกระทำได้ สำหรับทางด้านทหารเวลานี้ ได้ทราบว่า ร.อ. ประจำภารกิจที่ รักษาราชการ แม่กองคนคัวกำลังทำการทดสอบเกี่ยวกับยานนี้ เพื่อใช้ในการรักษาโรคมงเครื่อพิษ (Glanders) อยู่อย่างนักเขมัน ถ้าหากไก่ผลเป็นที่พอกในแล้วห่วงว่าคงจะได้นำความรู้อันนั้นออกเผยแพร่ให้พวกราชได้ทราบกันโดยทั่วถึงบางส่วนแน่.

ยานี้โดยมากทำเป็นผงสำหรับละลายน้ำกลั่นน้ำ และบางทกทำเป็นผงผสมกับ Penicillin ก็มี.

#### ๔. Bacitracin ยาขนาด Dr. Meleney

& Johnson เป็นผู้พบ โดยทำไก่มาก เชื้อ *B. Subtilis* ละลายในน้ำได้ง่ายและเสื่อมคุณภาพเร็ว แต่ถ้าอยู่ในสภาพเป็นผงและไม่ถูกความร้อนสูงนัก ก็ไม่เสื่อมคุณภาพได้ง่าย ยาขนาดเมื่อลดลงแล้วนำเข้าเก็บในตู้เย็น จะเดิมภายในเวลาประมาณ ๓ สัปดาห์.

Bacitracin ทพสมบูรณ์ผงหรือน้ำ ใช้สำหรับใส่แผลสกปรกต่างๆ ได้คุ้ม นอกนั้นยังใช้สำหรับรักษาหูเป็นน้ำหนวก

## สัตว์แพทย์กับการใช้ยาปฏิชีวนะ

๓๙

(Otitis externa) ตาอักเสบมีหนอง โรคท้องเดินในสุกร สุนัข ควรให้กินยานี้ในขนาด ๑๐,๐๐๐ ยูนิต วันละ ๔ เวลา.

สำหรับประเทศไทยฯ ยานานนี้ยังไม่เคยจะแพร่หลายนัก การใช้รักษาสัตว์ ก็ยังเหมือนว่าจะยังไม่มีผู้ใดใช้ทดลองใช้กันเลย.

๕. Aureomycin ยานานน Dr. B.M. Duggar เป็นผู้พย โถยทำมาจากเชื้อ Streptomyces aureofaciens มีประโภคที่สำหรับใช้รักษาโรคไก่กว้างของมากกว่ายาจำพวกอื่นๆ ทั้งยังคงสภาพอยู่ได้นาน เมื่อทำเป็นผงแห้ง บานใช้รักษาโรคไก่หลายวิธี เช่นให้กิน ฉีดเข้าเส้นโลหิต และใส่แผ่นหรือปั๊กแผ่นก็ได้ เมื่อฉีดเข้าเส้นโลหิตต้องระวัง อย่าผิดสมทังวิวัฒนา ท้องผสมใหม่ๆ และอย่าให้รัว ในขณะฉีด ได้ เพราะจะทำให้บวมเน่าเป็นหนองรักษายาก ไม่ควรใช้ยานานกับสัตว์จำพวก Ruminants เพราะจะทำให้สัตว์เกิดอาการท้องเดินได้.

ขนาดที่ใช้ฉีดเข้าเส้นโลหิตสำหรับสัตว์ ก็คือ ๕ มิลิกรัมต่อน้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม ๗๕ ซ.ม. ถ้าให้กินครั้งแรกควรให้ในขนาด ๒๕ มิลิกรัมต่อน้ำหนักตัว ๑ กิโลกรัม ไปให้เพียง ๑๒.๕ มิลิกรัม ทุกๆ ๑๒ ช.ม.

ในค้านลักษณะแพทย์ ยา Aureomycin ใช้รักษาโรคไก่หลายอย่าง เช่นโรคเหตันน้ำอักเสบของโโค โรคปอดข้อเสบ โรคท้องเดินของลูกโโค (Calf Scour), Rickettsial infections, Atypical virus pneumonia, Fowl typhoid, Hemorrhagic septicemia, Swine erysipelas, Psittacosis & Ornithosis, Meningococcic infections, Staphylococcic infections และเชื้อ Cocco ที่คิดลีกรัม + ชั่งรักษาคัวของยาเพนนิซิลินไม่ได้ผล นอกจากนี้ยังปรากฏว่าใช้รักษาโรคเมကร์อิธรรมค่าไก่ผลตี้ คัวการฉีดเข้าเส้นโลหิต ทำเป็นช่องใส่แผลมเชื่อมต่อๆ ให้ตี้ หรือจะใช้ข่ายคาดหัวเขยร้อยในสุนัข แมวๆ ได้ สำหรับสุนัขที่เป็นโรค Distemper ให้กินยานี้ในขนาด ๕๐ มิลิกรัม วันละ ๒ ครั้งจะไก่ผลตี้ พอกโรคบิดเนืองจากเชื้อ Coccidia ก็ใช้รักษาได้ แต่ยานมราคางสูง และหาซื้อได้ยาก จึงยังไม่เป็นที่นิยมกันแพร่หลายนัก.

๖. Chloromycetin ยาน Dr. Paul Burkholder แห่งมหาวิทยาลัย Yale เป็นผู้พย ได้มารากเชื้อ Streptomyces venezuelae ใช้รักษาโรคไก่มากเหมือนกัน เช่น Rickettsia และโรคที่เกิดจากเชื้อ Virus บางชนิด ยานถูกคิดขึ้นมาเข้าสู่กระแสโลหิต

ภายในกระเพาะและลำไส้ ให้รักษา สำหรับทางค้านสัตวแพทย์ ยังไม่ได้ร่วมมือผู้ใดสนในนัก จึงไม่มีโครงการด้วยนัยนักขนาดที่ใช้แก่สัตว์โลกแน่นอน.

๙. Terramycin ยา Dr. A C. Finley เป็นผู้พิพากษา โดยทำมาจากเชื้อ Streptomyces rimosus เป็นผลิตภัณฑ์ของเข้ม ให้รักษาโรคไก่หอยชนิด เช่น โรคที่เกิดจากเชื้อ กรม + กรม - Spirochetes, Rickettsia

และเชื้อ Virus บางชนิด โดยมากใช้รักษาในคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคบิดชนิดกัว Amoeba ใช้ยาตัวเดียวกันผลลัพธ์มาก แต่สำหรับในสัตว์แล้ว ยังไม่แพร่หลาย และรักษาดีนัก จึงยังไม่มีผู้ใดทราบขนาดและใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง ยานานนี้ไม่ใช่ร่างเสื่อมคุณภาพได้ง่ายๆ สามารถเก็บเข้าไว้ในห้องดูดหกนิชธรรมชาติได้เป็นเวลาถึง ๑๗ เดือนโดยไม่เสีย.

## ไวนานิราม ๘ อายุใน

# ไวนารัตน์ ไวนานิราม

RUSSELL - LABORATORIES. U.S.A.



รุ่งปีนคุณเจ้าอยุตติบุตรก้าวแพดด์  
สกัดน้ำอ่อนคามาเลื่อนไฟฟ์เซอร์เจนชาร์ท้าดอาหาร  
บำรุงกำลังแก่คุณแม่ คุณรักใช้ รักษาอยู่เสมอ

เม็ดก้อนแบบพิเศษร้าวอ่อนเยาว์ต้านทานภัยเชื้อโรค

บริษัท เทคนิกาเนท (2490) จำกัด

๙๕ เพชรบุรี แขวงและลักษณ์ โทร. 21433

ถูกจัดทำขึ้นในประเทศไทย.

