

ท่านจะเลี้ยงไก่อย่างไร

พจน์ พูรังษี

บรรคนักเลี้ยงไก่ทั้งหลาย เมื่ออาชีพ
และเลี้ยงจำนวนเล็กน้อย มักจะประสพอยปร-
ลวน กุ๊สรวบกับสำคัญคือ “โรค” โรคติด
ต่อของไก่ บางชนิดสามารถทำให้ไก่ตาย
ได้เกือบทุกชนิด แต่เดียวก็ได้ เวลาใด
มีผู้เลี้ยงไก่เป็นอาชีพ เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุก
ที่ บางรายเลี้ยงไก่ทั้งๆ ที่ไม่มีความรู้ใน
เรื่องไก่เลย ซึ่งจะทำให้เงินลงทุนไว้หาย
ไปพร้อมกันไป การเลี้ยงไก่ไม่ใช่ของง่าย
แท้ก็ไม่ ยากเกินไป จนไม่สามารถจะทำได้
หากประสงค์ ของการเลี้ยง ก็เพื่อท้อง การไว้
และจำนวนไก่ให้เพิ่มปริมาณมากขึ้น ฉะนั้น
ควรทราบวิธีของกันโรคไว้ข้าง ถึงแม้ว่า
เป็นสิ่งเล็กน้อยเท่าๆ กับรายกันอยู่แล้ว
ขอพึงสังเกตมุกงน:—

๑. มีบางท่านพอคิดจะเลี้ยงไก่ก็มักจะ
เลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก ที่เกิน โดยหวัง
ผลเลี้ยงมาก ได้กำไรมาก ไม่คิดถึงผลเสีย
ทาย การเลี้ยงมากโดยคาดที่ไก่จะเกิดโรค
ก่อนมีมา และง่ายขึ้นเพียงนน ฉะนั้น
ควรจะเริ่มเลี้ยงเพียงจำนวนน้อยๆ ก่อน
เพื่อหาความชำนาญ ทั้งในด้านการบำรุง
เลี้ยงและภาระขั้นกันโรค.

๒. ผู้เลี้ยงไก่ส่วนมากมักชอบไปชม
ไก่ตามเดาต่างๆ เมื่อทราบว่าเดานเด่นม
ไก่พันธุ์ดี มีความสามารถใหญ่โตแบบใหม่
หรือบางทีก็ต้องการ แลกเปลี่ยน และซื้อไก่
มาเลี้ยง โดยหาทราบไม่ว่าท่านอาจจะนำ
เข้าเชื้อโรคจากทอนหรือจากเดาของท่าน
เองไปสู่เดาท่าน ไปคนนั้นหรือท่านอาจจะนำ
เข้าเชื้อจากเดือนเข้าสู่ เดาไก่ของท่านเองก
ได้ เพื่อบังกันเหตุอันนั้น ควรหันมิให้ผู้
หนึ่งผู้ใดเข้าไปชมไก่ในเดาโดยไม่จำเป็น
เข้าใกล้เฉพาะผู้เลี้ยงคงเท่านั้น และทุกนา
ประท์เดาควร มัดปันขาวทั้งไว้สำหรับให้ผู้
เข้าออกเช็คเท่าเดียวกัน.

๓. การซื้อไก่จากเดือนมาเลี้ยง ท่าน
อาจ จะนำเข้าเชื้อโรคเข้ามาโดยไม่รู้ตัว
 เพราะไก่อาจจะไม่แสดงอาการของโรคให้
เห็นในตอนแรกๆ เพื่อความปลอดภัยท่าน
ควรเลี้ยงแยกไว้ต่างหากอย่างน้อยทศกัล
วัน ไม่ควรนำเข้าไปเลี้ยงในเดือนของท่าน
ทันที ต้องเมื่อพ้นกำหนด ๑๐ วันแล้วและ
ไก่เป็นปกติจริงจังน้ำไปเลี้ยงร่วมเดาเกี่ยว
กันได้ สำหรับเรื่องนี้ไก่พับเห็นมหาศาล
รายแล้ว โดยมีผู้นำไก่บ่วยมาให้กรา ครั้น

ถ้ามีประวัติที่เกิดความรุนแรงมาก่อนหน้า ให้ทำการเดือนมาเดบงแล้วก็โรคจะหาย.

๔. สัตวแพทย์พำนัชสำหรับโรคที่ต้องมาให้ เช่น นก หนู เป็นต้น สัตว์เหล่านี้อาจมีไข้ ไอ กินเนื้ออาหารของไก่ หากแต่ไม่หาย แล้วก็เข้ามา กินเนื้ออาหารในเดือนที่ห้าม เช่น กินเนื้อไก่ ให้เกิดโรคได้ ฉะนั้นควรพยายามหาทางขึ้นกันเสีย เช่น ล้อมคั่วลดความชื้น ถ้าไม่สามารถทำได้ ก็ควรรักษาความสะอาดในบริเวณเด้ออย่างให้มีเศษอาหารตกหล่นอยู่ได้.

๕. การขึ้นกันโรคให้ทำการสักท้ายท่า เช่นและสำคัญยิ่งก็คือ “การสักวัคซีนขึ้นกันโรค” โรคที่ต้องให้ที่สำคัญมากที่สุดให้แก่ โรคนิวคาสเซล โรคอหวาน โรคคอกหัวใจ และโรคคอตัน โรคเหล่านี้ก็ต้องให้ร่างกายและรูปร่าง ซึ่งจะทำให้ไก่ตายได้เป็นจำนวนมาก ฉะนั้นเมื่อท่านลงมือเลี้ยงไก่ ลังแรกที่ควรรักษาดังนี้ การฉีดวัคซีนขึ้นกันโรคเหล่านี้เสีย.

เจ้าของไก่บางราย ไม่ยอมฉีดวัคซีนให้ไก่ของตน โดยให้รับคำขอเล่าจากผู้อื่นว่า เมื่อฉีดวัคซีนแล้วทำให้ไก่ตาย สำหรับเรื่องนี้ขอรับรองว่าไม่เป็นความจริง วัคซีนทุกชนิดก่อนจะนำออกใช้ หรือทำหนายให้แก่ประชาชน ให้ผ่านการทดสอบมาแล้ว

หากครั้ง เมื่อเห็นว่าคุณภาพของวัคซีนนั้น ให้ไก่ผลัดดังนี้นำออกจำหน่าย ท่องว่า เอาวัคซีนไปฉีดแล้วทำให้ไก่ตาย ฉะนั้นจะจากเจ้าของไก่ส่วนมาก ถ้าไก่ของคนป่วยที่อยู่บ้านไม่คิดหาวัคซีนมาฉีด ก็เมื่อไก่มีอาการผิดปกติแสดงอาการของโรคเกิดขึ้น หรือเล้าไก่บริเวณขา เกิดโรคขึ้นแล้วจึงให้มาขอซื้อวัคซีนไปทำการฉีดคั่วลดน้ำ ขอให้โปรดทราบเสียด้วยว่า “วัคซีน” ไม่ใช่ยาสำหรับรักษาโรค ฉะนั้นเมื่อท่านนำเอาวัคซีนไปฉีดให้กับไก่ท่านชั่งไก่นั้น อาจได้รับเชื้อโรคไว้แล้วแต่ยังไม่แสดงอาการให้เห็นและต่อมาอีก๒-๓วัน ก็แสดงอาการให้เห็นและภายในท่านจะลงความเห็นว่าการตายของไก่เกิดจากการฉีดวัคซีนนั้นมากกว่าเป็นการเข้าใจผิดอย่างมาก.

เพื่อความแน่นอน และปลอดภัย แก่ไก่ของท่าน ขอให้โปรดศึกษาโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ แห่งกองสัตวศาสตร์ กรมปศุสัตว์และสัตวแพทย์ เพื่อขอคำแนะนำในเรื่องโรคให้และขอให้ฉีดวัคซีนให้แก่ไก่ของท่าน ถ้าไม่เป็นการจำเป็นจริงๆ แล้วท่านมีควรจะนำวัคซีนไปฉีดคั่วลดน้ำ ซึ่งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ทุกนายยินดีบรรยายท่านด้วยความเต็มใจ และจะให้ความสุ��ากแก่ท่านทุกเวลา.