

การใช้ยาพวก Sulphanilamides แก่ไก่ที่เป็นโรคคอหิวด์

จิต วรมนตรี พูน นิตยสุทธิ
แผนกโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยฯ พญาไท

ในทันทีแก่ยาฉึก Soluseptasine 20% solution และยารับประทาน Sulphaguanidine เท่าที่สังเกตยา ๒ ชนิดนี้ให้ผลดีแก่โรคนี้ การรักษาคควรใช้ยาทั้ง ๒ ชนิดนี้ควบกันไป คือ

๑. ยาฉึก Soluseptasine 20% solution ขนาดที่ใช้ 0.5 c.c. - 2 c.c. ฉึกเข้าใต้ผิวหนัง หรือ เนอกلامที่โตบก ตาม

ขนาดของไก่ขนาดเล็กจนถึงโตเต็มที่ ฉึกวันละ ๑ ครั้งทุกวัน จนครบ ๓-๕ วัน.

๒. ยารับประทาน Sulphaguanidine ให้รับประทานครั้งละ ๑/๕-๑.๐ เม็ด วันละ ๒ เวลาตามขนาดของไก่.

ปรากฏว่า ไก่ที่นำมารักษา (ทั้งที่แสดงอาการและอยู่ในระยะพักไข้) มีโอกาสหายจากโรค ๗๐-๘๐%

จากการทดลองในอเมริกา ปรากฏผลว่า ถ้าเก็บไข่ไว้โดยรักษาระดับอุณหภูมิให้ไว้ 50 ฟาเรนไฮต์ ไข่บางส่วนเก็บไว้นานถึง ๕๒ วัน ยังมีเชื้อฟักได้ อุณหภูมิที่ 30-40, และสูง 60-70 ฟาเรนไฮต์ ทำให้ผลที่ได้รับจากการฟักลดน้อยลงไป.

สรุปได้ว่าไข่ฟัก ควรเก็บในอุณหภูมิระหว่าง 50-55 ซึ่งจะได้ผลดี และเก็บไว้ได้นานระหว่าง ๗-๒๑ วัน.