

# การทำลายความรู้สึกด้วย Anavenol.

ได้มีการโฆษณา มาก มาถึง การใช้ Anavenol ว่าเป็นทวิยาทำลายความรู้สึกทั่วไปที่ให้ผลดีสำหรับม้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายโรงพยาบาล ของคณะสัตวแพทย์ คาสตราจารย์ เคยใช้ Anavenol เป็นยาทำลายความรู้สึกแก่ม้าถึงสองครั้ง ไม่ได้รับผลเป็นที่พอใจ จากที่ค้นของบทความซึ่งไต่ถามมาลงในฉบับนี้ แสดงให้เห็นว่า ข้อนี้มาจากข้อบกพร่องทางเทคนิคก็เป็นได้ การบันทึกข้อบกพร่องเช่นนั้นอาจเป็นการช่วยผู้ใช้อื่น ๆ ซึ่งตั้งใจจะใช้ยานานนี้.

Anavenol เป็นยาของบริษัท Imperial Chemical Industries (บริษัทอีสต์เอเชียติก เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย) เป็นยาสำเร็จรูปของ B-naphthoxyethanol ๑๐% ทวิยาที่อยู่ในยานี้มีคุณสมบัติกว้างแต่ ๑๐ ถึง ๓๐ u.

ในบทความชื่อ "น้ายา B-naphthoxy ethanol (anavenol)" ว่าด้วยการทำลายความรู้สึกระยะสั้นสำหรับม้า ลงพิมพ์ในหนังสือ The Veterinary Record ประจำเดือนสิงหาคม ๑๙๕๐ นาย H.P. Parry ได้บันทึกไว้ว่า หากฉีดเข้าเส้นในขนาด ๓๐ ถึง ๕๐ mg. ก่อนนำหนักรีดหนึ่ง ก.ก. ใน

ระยะเวลา ๘๐ ถึง ๑๒๐ วินาที ม้าจะเริ่มโซเซและแล้วจะลงนอนลงหนึ่งบนพื้น ในระยะนี้ไม่ปรากฏอาการแสดง ความเจ็บปวดเลยในเวลาทำการ ผ่าตัดก็เรียบร้อยตามส่วนขาแม้ส่วนหัว คอ ทา และหู ยังจะคงทำหน้าที่อยู่ก็ตาม ม้าจะลุกขึ้นได้เองในเวลา ๑๕ นาที โดยปราศจากการกักรวน.

ถ้าในขณะที่ยังนอนอยู่นั้น ฉีดเพิ่มเติมจนม้ารียา ๕๐ ถึง ๑๐๐ mg. ก่อ ก.ก. reflexes จะหายไปจากส่วนหัว คอ ทา และหู สัตว์จะหมดความรู้สึกตลอดทั่ว ระยะนี้อาจมีอายุจนถึงสองชั่วโมง ซึ่งอาจดำเนินการ ผ่าตัดได้ แม้ ส่วน ของ large peripheral nerve จะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวได้เล็กน้อยเท่านั้น มีผลเล็กน้อยแก่ความกดกันของโลหิตหรือเกือบจะไม่มีเลย ในสัตว์บางตัว ปรากฏสัลดองตามเยื่อชุ่ม และมีปัสสาวะสีน้ำตาลไหม้หลังการฉีด.

ขนาดใช้ สำหรับ ทำลาย ความรู้สึก ระยะสั้น ระยะเวลา ๑๕ นาที Induction dose หรือ I.D. สำหรับม้าขนาดย่อม คือ ๕๐ mg. ก.ก. เมื่อม้าล้มลงนอนแล้วอาจฉีด I.D. เพิ่มเติมได้ทุก ระยะ ๑๐ ถึง ๑๕ นาทีไปได้จนครบสองชั่วโมงหรือนานกว่า ถ้าต้อง

การทำลายความรู้สึกนาน อาจค่อยฉีก I.D. เพิ่มในระยะ ๒ ถึง ๕ นาทีโดยทันที สัตว์ลงนอน ถ้าฉีกยาเข้าไปโดยเร็ว กล่าวคือ ฉีก I.D. ในเวลา ๒๐ ถึง ๒๕ วินาที หรือ ๔ หรือ ๕ ของอัตราที่แนะนำไว้ ลมหายใจจะหยุด การให้ยาโดยเร็วเช่นนี้อาจใช้สำหรับฆ่ามาเมื่อต้องการทำลาย.

พิษของยา ถ้าการฉีกนั้นเร็วเกินไป ลมหายใจอาจหยุดไปครู่หนึ่ง หากเกิดเป็นเช่นนั้น การฉีกควรดำเนินต่อไปช้าๆ การหยุดของลมหายใจชั่วคราวนั้น ตามปรกติไม่เป็นอันตราย ถึงกระนั้นก็ตาม ถ้าฉีก ๓๐ ถึง ๕๐ ค็อก.ก. ในระยะ ๒๕ วินาที แทนที่จะเป็น ๑๒๐ วินาทีแล้ว ลมหายใจจะหยุดพร้อม มีอันตราย นอกจากการหยุดของลมหายใจแล้ว อาจมี large jugular pulse พร้อมกับ regurgitation ในกรณีเช่นนี้ จะต้องผ่อนการฉีกให้ช้าลง หรือหยุด อาการ ซึ่งอาจปรากฏต่อไปได้แก่ หายใจถี่และขัด ซึ่งจะหมดไปเองภายในเวลาสองสามชั่วโมง ในหัวใจอาจมี cardiac decomposition เมื่อสัตว์พยายามจะขึ้นขึ้น ถ้า myocardium อ่อนอยู่แล้วก่อนการฉีก อาจมีผลถึงตาย.

น้ำยานี้ ไม่ก่อให้เกิด การระคายเคือง เมื่อพลาทออกนอกเส้น และหากน้ำยาจะ

หลุดเข้าไปใน tissue รอบๆ เส้นระหว่างฉีก ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการรักษาภายหลัง.

เมื่อฆ่าลงนอน หลัง การฉีก I.D. แล้ว การทำลายความรู้สึกอาจดำเนินต่อไปด้วย โคลโรฟอร์ม ถ้าเตรียมไว้ก่อน หรือจะให้กิน chloral hydrate ก่อนฉีก anavenol ก็ได้.

การฉีกควรใช้กำลังกด positive pressure (เช่นใช้ syringe) และไม่ใช่ gravity.

เทคนิคการปฏิบัติ มาที่ระลึควรรู้ ใช้ขลุ่ยแข็งแรง และมีคนคุมหัวไว้ ถ้ามีคนคนเดียว ให้ใช้เชือกขึงขมกขึงค้ำ ฉีก ๓๐ ถึง ๕๐ ในระยะหนึ่งนาทีครึ่ง ใช้หน้าพิกาจับเวลาด้วย หากสัตว์แสดงอาการทรงตัว ไม่ยอมก่อนที่จะฉีกหมด ก็เหลืออาจเร่งฉีกให้เร็วขึ้นได้ เมื่อมาเริ่มขยับขากรรไกร และถอนท้ายชักแกว่ง ให้ถลอกเข็มออกจากเส้น คนคุมหัวคั้นมาให้ถอยหลังไปก้าวหรือสองก้าว พร้อมกันนั้นคิงขมกมาหาไหล่ ด้านตรงข้ามกับที่คองการ จะให้ล้มเมื่อลมหายใจหยุดแล้ว คนคุกเข่าบนคอจะคองจับหัวไว้ให้มั่นคงกับพื้น มีคนหนึ่งจะพยายามลุกขึ้น ต่อจากนั้นอาจฉีก anavenol เพิ่มเติมตามที่คองการ ถ้ามีขลุ่ยค้ำ ฟางหนุนใต้คองเพื่อให้ง่ายขึ้นแล้ว เส้นจะปรากฏเด่นชัด และแทงเข็มก็จะง่ายเข้าทั้งจะให้หน้าขลุ่ยซึ่งอาจมีนั้นไหลออกได้.

ระยะของการหมดควมรู้สึก ขนาด ๓๐ ถึง ๕๐ mg. ทำให้หมดควมรู้สึกระยะสั้น (plane 1) นานประมาณ ๑๐ นาที อีกห้านาทีต่อมาจะลุกขึ้นยืนได้ ถ้าฉีด I.D. เพิ่มเมื่อมาดมแล้ว จะเกิดการหมดควมรู้สึกระยะปานกลาง (plane 2) นานตั้งแต่ ๒๐ ถึง ๒๕ นาที ขนาดมากอาจให้การหมดควมรู้สึกระยะนาน (deep anaesthesia) ถ้ามีผู้คอยให้ยา (anaesthetist) วิตติตสุกควรคอยๆ ฉีด anavenol ติตต่อกันไป เพราะวิธินอนควมคุมระยะของการหมดควมรู้สึกและได้ผ่อนการทำลายควมรู้สึกให้น้อยลง เมื่อการผ่าตัดเกือบเสร็จขนาดสูงสุด (maximum dose) ไม่ว่าจะฉีดยาใดไม่ควรให้เกิน ๑๐๐ mg. ต่อ ๑ ก.ก.

การพันและพักพัน มีส่วนมากจะลุกขึ้นนั่งโดยเร็ว แต่จะไม่พยายามลุกขึ้นยืน จนกว่ามันจะรู้สึกแข็งแรงพอที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยไม่ต้องช่วยเหลือ แต่ทางที่ดีเมื่อมาลุกขึ้นนั่งแล้ว คนคุมหิ้วจะต้องยกหัวไว้ให้มัน และอีกคนยกหางไว้เพื่อให้มันทรงตัวได้ก็เวลาลุกขึ้น มันแก้มไม่ควรปล่อยให้คืน เพราะทำให้เกิด strain ในหัวใจมาก มีส่วนน้อยที่เหิงออกและตายใจสั้นๆ อยู่ตั้งหลายชั่วโมง แต่อาการเหล่านี้จะหายไปโดยไม่ต้องเยียวยา.

Dr. Parry ใช้ anavenol สำเร็จแก่ม้า

๕๓ ตัว ทว่าอนที่สกัดคอกโลกมาอายุ ๓ วัน แกทสุกอายุ ๒๖ ปี แต่ดงกระเนนกกยงมมาตายตัวหนึ่ง มาตัวนี้หลังจากการผ่าตัดกินเวลา ๕๐ นาทีแล้วพ่น พยายามลุกยืนแต่เท่าพลาคนพ่น ลนอยเรื่อย ๆ กว่าจะยืนได้กินเวลาถึง ๒๐ นาที แต่กลับลงอีกโดยรวดเร็วและตาย การตรวจซากปรากฏว่า cardiac decomposition.

มีนอชรายที่ทำลายควมรู้สึกไม่พอเพียง เนื่องมาจาก pre anaesthetic excitement เวลา induction ช้า และ induction dose ให้ช้าเกินไป ห้ามให้อาหารหรือน้ำเกิน ๒๔ ชั่วโมง.

ข้อแนะนำ I. D. ควรให้ในเวลา ๕๐ ถึง ๑๒๐ วินาที และไม่เกิน ๑๕๐ วินาที โดยใช้น้ำพิกาจยเวลา.

ถ้าสงสัยว่า สัตว์นั้น จะวางยา สลบยากก็ให้ ใช้ chloral hydrate ให้กิน.

ข้อความข้างต้นนี้เป็นข้อสังเกตของ Dr. Parry และข้ออ้างถึง light horses นั้นหมายถึง light horse ของอังกฤษซึ่งมีขนาดเท่ากับม้าฮอลสเทรเดย์ สูง ๑๔.๒ ถึง ๑๖.๒ เซนติ.

ในหนังสือ Veterinary Record เล่มเดียวกันนั้น Dr. Parry ได้เขียนบทความอีกเรื่องหนึ่งชื่อว่า "An Improved Form of "Anavenol" "Anavenol" -K- The

Combination of B-Napthtoxyethanol with Thialbarbituric ("Kemithal") Acid."

ในบทนี้ เขาแสดงว่าได้ตรวจการผสมของ Anavenol กับ barbituric, thialbarbituric และ chloral แล้ว การผสมที่ถูกต้องของยาเหล่านี้ได้แก่การผสม anavenol suspension ๑๐ เปอร์เซ็นต์ กับ "Kemithal" ๒.๕ เปอร์เซ็นต์ w/v of Kemithal ยาผสมนี้ช่วยบรรเทา reflexes ของหัวและคอ เหนือ และการหายใจที่อ่อนโยนลง และในขณะเดียวกันอันตรายในการเสียน้ำไม่เพิ่มขึ้น การฟื้นคืนชีพที่ช้ากว่าแต่ในการทดลองก็ใช้ได้เพียงสิบตัวเท่านั้น.

ขนาดและความนานของการสลบใช้ ๒๐ ถึง ๓๘ m.g. ต่อหนึ่งก.ก. ของ Anavenol กับ ๕ ถึง ๘ m.g. ต่อก.ก. ของ "Kemithal" acid หากใช้ Kemithal acid มากกว่า ๒๐ mg. เช่นการทำลายความรู้สึกระยะยาวแล้ว การฟื้นคืนชีพก็ย่อมช้าไปอีก ฉะนั้นในกรณีเช่นนี้ ต่อจากการฉีดยา Anavenol-K ครั้งแรกแล้ว ให้ฉีดยาต่อไปด้วย Anavenol เท่านั้น หรือจะใช้ผสมกับอย่างอื่นก็ได้.

ข้อสังเกต สำหรับการผ่าตัดระยะสั้นแล้ว Anavenol-K มีมากกว่า Anavenol อย่างเดียว การควบคุมหัวเมื่อมีลมลงนอนแล้วง่ายเข้า มีเหงื่อออกน้อยเมื่อฟื้นและการรบกวนทางหายใจก็น้อยด้วย ส่วนการ

ผ่าตัดระยะยาวนั้น Anavenol-K ไม่ค่อยได้ผลเป็นที่พอใจ.

ในหนังสือ Veterinary Record ฉบับเดียวกันนี้เอง นาย W.T. Harrow ได้เสนอบทความชื่อว่า "A mixture of B. Napthtoxyethanol with Thialbarbitone (Anavenol-K) as an anaesthetic in Farm Animals" เขายืนยันการค้นพบของ Parry ในข้อวางยาสลบระยะสั้นสำหรับม้า แต่งานส่วนมากของเขาเกี่ยวกับโค ซึ่งปรากฏว่า Anavenol-K มีความปลอดภัยอยู่มากในการใช้.

การวางยาสลบ (แก่โค) ไม่จำเป็นต้องเตรียมอย่างใดแก่สัตว์ นอกจากว่าไม่ควรให้อาหารมาก ภายในระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมงหรือกว่าก่อนการผ่าตัด และไม่จำเป็นต้องคอยระมัดระวัง มากไปกว่าให้คนคอยคุมหัวไว้คนเดียว เขากล่าวว่าน้ำยาควรฉีดยากำลังผลึก ไม่ใช่ความกกด่วง (gravity) โดยใช้ซีรินเรคอร์ค สัตว์ในจำพวกน้ำหนัก ๕๑๐ ก.ก. ซีรินไม่จำเป็นต้องใช้เกินขนาด ๑๐๐ ซม.<sup>๓</sup> ฉะนั้น เขาจึงได้ใช้ขนาดนั้น หากสัตว์ขนาดใหญ่กว่านั้น ควร สบ ยาเพิ่ม ไว้ให้พร้อมใน ซีรินสำรอง สัตว์ขนาดธรรมดาจะเริ่มไซเซ หลังจากฉีดยาเข้าไปแล้วแค่ ๖๐ ถึง ๗๕ ซม.<sup>๓</sup> และฉีดยาเข้าไปอีก ๒๐ ซม.<sup>๓</sup> ก็จะหมดความ

รู้สึก ถ้าไม่สลบก็ควรฉีกเพิ่ม.

ขนาด ขนาดแท้จริงยังไม่ทราบ แต่  
คิดเฉลี่ย แล้วคือ ๑๐ ซม.<sup>๓</sup> ต่อ ๕๐ ก. ก.  
ข้างกันไปตามตัวของสัตว์ และจำเป็นต้อง  
ฉีก Anavenol - K ด้วยความเร็วตามกำ-  
หนด หากด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดซึ่งทำให้การ  
ฉีกต้องชะงักลงก่อนถึงขั้น induction ควร  
พักรอเสีย ๕ ถึง ๑๐ นาที แล้วเริ่มฉีกต้ง  
กันใหม่อีกครั้ง.

ระยะของการฉีก ๐.๑ ซม.<sup>๓</sup> ต่อ  
หนึ่งวินาทีต่อ ๕๐ ก.ก. เช่นลูกวัวหนัก ๕๐  
ก.ก. ระยะฉีกคือ ๑ ซม.<sup>๓</sup> ต่อ ๑๐ วินาที  
และสำหรับ ๑๐๐ ก.ก. ๑ ซม.<sup>๓</sup> ต่อ ๕  
วินาที สำหรับสัตว์ขนาดใหญ่ระยะก็เพิ่ม  
ตาม สัตว์ที่มีน้ำหนักแต่ ๓๐๐ ถึง ๖๐๐  
ก.ก. เกือบคงที่คือ ๑ ซม.<sup>๓</sup> ต่อวินาที

การล้มสลบ เมื่อได้ฉีก Anavenol-K  
พอจำนวนแล้ว สัตว์ก็จะล้มลงบนพื้น  
สำหรับม้าล้มทางขวาหลัง ส่วนสัตว์พวกขด  
เองล้มทางซ้ายหน้า ในคราวพ่น สัตว์มัก  
จะนิ่งและอาจหายใจได้ในเวลาสองสาม  
นาที ไม่มีการดิ้นหรือดิ้นรน.

การฉีกครั้งเดียว การฉีกครั้งเดียว  
ทำให้โค narcotised แต่ข้างตัวยังมีความ  
รู้สึกทางผิวหนัง (skin sensitivity) ฉะนั้น  
ควรใช้สำหรับการผ่าตัดที่ย่อย แต่ถึงกระนั้น  
ก็อาจเลื่อยเขาออกได้.

การรักษาให้ความสลบคงอยู่ ด้วย  
การฉีกเพิ่มเติมอาจรักษาการสลบให้คงอยู่  
ได้อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง.

ขนาดมากที่สุดที่จำเป็นจะทำให้การสลบ  
คงอยู่ได้นั้นคือ อีกครึ่งหนึ่งของขนาด I.D.  
เดิมฉีกใน ระยะ ถูกต้อง ขนาด ฉีกแรก  
(Maintenance Dose) ให้ฉีกหลังขนาด I.D.  
แล้วประมาณ ๕ นาที และจะให้เวลาสลบ  
๒๐ ถึง ๓๐ นาที พอที่จะผ่าตัดที่เขานม,  
ผ่า tumours ออก, ควักตา ฯลฯ ได้ ขนาด  
ฉีกครึ่งสอง (M.D.) ให้การสลบสำหรับ  
การผ่าหน้าท้องเฮาลูก ออก (caesarian  
section) ขนาดฉีก (M.D.) ครึ่งสอง และ  
ต่อมาจะให้ได้เท่าที่จำเป็น ในการผ่าหน้า  
ท้องนั้น ขนาดฉีก I.D. กับ M.D. อีกครึ่ง  
นับว่าเพียงพอ แต่การตัดอวัยวะอาจต้อง  
ฉีก M.D. ครึ่งสอง เมื่อพ่น ๑๕ นาทีแล้ว  
ในการผ่าหน้าท้องนั้น ฉีก I.D. ครึ่งที่จะทำ  
การผ่าตัด ต่อมาฉีก M.D. ครึ่งหนึ่ง  
ทั้งนี้ให้การสลบเพียงพอ ที่จะเปิด หน้า ท้อง  
และมดลูกตลอดจนขยับเขยื้อมมดลูกด้วย ต่อ  
มาฉีก M.D. ครึ่งที่สอง เพื่อเชยกล้ามเนื้อ  
และหนัง.

Anavenol - K ไม่เป็นพิษแก่ลูกในท้อง  
(foetus) กล่าวไว้ว่า Anavenol - K ราคาก  
กว่ายาพวก barbiturates.

บทความนี้เป็นข้อวิจารณ์คัดลอกข้างยาว

สำหรับเรื่อง แต่เนื่องจาก Anavenol และ Anavenol-K อาจถูกเลือกเป็นยาสำหรับทำลายความรู้สึกบ่อยๆ การทำตามเทคนิคที่ถูกต้องจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนหน้าที่จะอ่านบทความนี้ เจ้าหน้าทีสถานพยาบาลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ฉีด Anavenol แก่ม้าตัวหนึ่งถึงสองครั้งโดยมิได้รับผลเป็นที่พอใจ ถึงกล่าวแล้วแต่ก่อนนั้น ไม่มีอาการ สลวยเลย นอกจาก ม้าล้มลงนอนทั้งนั้นเช่นเพราะการฉีกขาเกินไป ครั้งแรกฉีด ๑๒๐ ซม.๓ ครั้งหลังฉีด ๒๐๐ ซม.๓ แต่ทั้งสองครั้ง เราใช้ไซเรน ๕๐ ซม.๓ เพียงอันเดียว และการสับเติมใหม่ทำให้เสียเวลามาก.

ข้อที่ว่า Anavenol ต้องการความเอาใจใส่ทางเทคนิคอย่างรอบคอบนั้น อาจเห็นได้จากรายงานของ Dr. Pickup (Vet. Rec. Sept. ๑๙๕๐) ผู้ได้เห็นการแสดงตอนม้าอายุสองปี โดยมีนาย Parry เป็นผู้วางยาสลบ Dr. Pickup กล่าวว่า ผู้คนไม่ได้ลองว่า ลูกม้าหมกความรู้สึก หรือยัง เขาคงเชื่อคำ Dr. Parry ผู้วางยาว่า "ลงมือได้" แต่เมื่อได้ผ่าลงไปแล้ว Dr. Pickup พิจารณาเห็นว่า ลูกม้านั้นยังคงรู้สึกเจ็บปวดอยู่จากการผ่าตัด และเห็นว่าลูกม้านั้นมิได้หมกความรู้สึกโดยสิ้นเชิง ควรเว้นระยะเพื่อให้หมกความรู้สึกยิ่งขึ้น แต่

ข้อนี้ มิได้กระทำ เขาเห็นว่าสมควรฉีด Anavenol เพิ่มเติม ต่อมา นาย Parry อธิบายถึงข้อนี้โดยกล่าวว่าเขากำลังให้การแสดง และความสนใจส่วนหนึ่งมุ่งอยู่แต่การอธิบายวิธีการให้แก่ผู้มาทำการแสดงนั้น ข้าพเจ้าคิดว่า ข้อสรุปที่เราจะได้อ่านคือ การทำลายความรู้สึกด้วยยาจำพวกนี้ ควรถือเป็นงานของผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะในกรงเทพฯ และเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลควรระมัดระวังตัวเองให้เป็นเช่นนั้น เพื่อว่าผู้ปฏิบัติงานอื่นจะได้เรียกไปช่วยเหลือ ทั้งเป็นการสมควรที่จะทดลองยานแก่กระบือ และมีค่าอย่างยิ่งในการประหยัดเวลาและแรงงาน การล้มควยเครื่องล้ม หรือ side lines และการใช้ผู้ช่วยหลายคนย่อมไม่จำเป็น ควรจะมีค่าอย่างยิ่งในการตอน เพราะสัตว์ส่วนใหญ่ในประเทศนี้ ยังมิได้รับการตอนจนกว่าจะโตเต็มที่ ซึ่งจะทำให้การผ่าตัดเป็นสิ่งทารุณ ถ้าไม่ทำลายความรู้สึกโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ หากสัตว์แพทย์ จะต้องทำการผ่าตัดโดยมีความเจ็บปวดโดยไม่วางยาแล้ว ย่อมจะทำให้เกียรติยศของ ตนค่อยไปในสายตาของคนธรรมดา.

ในที่สัณนี้ ข้าพเจ้าขอถือโอกาสขอบคุณคุณ ยี่ปุ่น หัสสิณีเสวี ที่ได้ถือสละเวลาอันมีค่าในการร่วมมือแปลเรื่องของข้าพเจ้าในโอกาสนี้ด้วย.

อาร. พี. ไจนส์