

อาการแพ้ Fantorin ในสุนัข

จิต ภรรณตรี

พูน นิตยลักษณ์

แผนกโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทย์ พญาไท

Fantorin เป็นยาที่ผลิตจากบริษัท Glaxo ซึ่งเป็นน้ำยา ๑.๔% ของ Sodium-Antimony-Bispyrocatechol ๑-๓ : ๕ sodium disulphonate. ใน 1 C.C. มี Trivalent Antimony อยู่ ๔.๑ มิลลิกรัม ยานี้เป็นยาที่ใช้รักษาโรคหัวใจชี้ช้าพวง Antimony เช่นโรคพยาธิในหัวใจ (Heartworm) โรคเนื่องจากไข่ของคลอค หรือท่ออวัยวะสับพันธุ์ของสุนัข (Venereal Granuloma) เป็นก้อนขนาดใหญ่ที่บดเบี้ยนศักดิ์ประمام ๑๗ เซนติเมตร กว้างและยาวเข้าหากันเป็นหนัง หรือเนื้อกล้ามแทรกต่ำราวนี้ ยังไม่หาย ก็อาจจะถูกต่อไปได้อีก สุนัขบางตัวต้องนิ่มมากกว่า ๒๖ เซนติเมตร ขนาดที่ใช้แล้วแต่ขนาดสุนัข สุนัขขนาดธรรมดามักเริ่มต้นกับ ๐.๘ - ๑ c.c. และก่อให้เพิ่มขึ้น ๑.๕ c.c. และ ๒ c.c. ในสุนัขใหญ่มากๆ สุนัขบางตัวกินต่ำข้านี้ได้ แต่บางตัวกินไม่มาก คงแสดงอาการแพ้ยาเรื้อรัง อาการแพ้ยานี้เท่าที่สังเกตพบมีอยู่ ๒ อย่าง คือ

๑. เมื่อสุนัขแพ้ยา จะมีไข้สูง ชั่วโมงอาหาร ถ่ายมูลมากๆ หมายความว่าบวมที่

ทึบจมูกหายใจลำบากคล้ายเบ็นหัวตีน อาการบวมตามเท้า แต่บางตัวที่ตีนห้องขาเขินและป่วยกล้ามเนื้อ ในรายเช่นนี้ต้องหยุดให้ยาเสียแต่แรกที่พยุงอาการแพ้ยา แต่เมื่อจากสัตว์ไข้สูง แสดงมีปัจจัยกล้ามเนื้อ ควรให้ยาพอกแอลไฟริน ๔๙ ลักษณะ ๒-๓ วัน สักวันก็มีภาวะหายเบ็นปักติดคอกกินอาหารໄก้และไข้ลดลง.

๒. สุนัขอาเจะแพ้ยาโดยแสดงอาการมีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติ เบื้องอาหาร ซึ่ม แต่ถ้าแพ้ไม่มากอาจจะกินอาหารได้บ้าง แต่อดทนนิ่งคงต่ำกว่าปกติประมาณ ๑-๒ วัน ก็รีฟาร์นีไซด์ ถ้าสุนัขแสดงอาการเช่นนี้ ก็ควรหยุดฉีกยาและให้ยาบาร์บูโรเช่น Glucose Calcium และวิตามิน ให้ยาบาร์หัวใจ เช่น Camphorated oil และหยดฉีกยาสัก ๒-๓ วัน รอจนอุณหภูมิขึ้นทางเรื่อนิดๆ ต่อ ยาน้ำนมมากๆ จะทำอันตรายแก่ตัวค้างน้ำเวลาใช้จะต้องระมัดระวัง คืออย่าให้สุนัขแสดงอาการแพ้ยามากๆ เพราะอาจจะทำให้สุนัขเบื้องอาหาร อาจเขียนอ่อนเพลียและตายได้.