

การตายเนื่องจากพิษโลตันในสุนัข ๑ ราย

ม.ร.ว. ชนาญวัต เทวกุล สต.บ. น.ส. สุพิศ ณรงค์รักษ์สัตว์ กบ.

แพทย์เกสชัชวิทชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ พญาไท พระนคร

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ศกน. เวลา
ประมาณ ๑๖.๓๐ น. นายและนาง Schmidt
แห่งบริษัท East Asiatic Co. ได้นำทราก
สุนัขผู้สีขาวและดำ พันธุ์ Spaniel ๑ ตัว
มาให้ตรวจรังสีส่อง สาเหตุแห่งการตาย
สุนัขดังนี้

ประวัติ เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. ตอน
กลับมารับประทานอาหารกลางวันที่บ้าน พย
คนใช้กำลังอาบ โลตันให้สุนัข พบร้า
๑๗.๐๐ น. คนใช้มาระง่านว่าสุนัขหาย
ก่อนการอาบน้ำ จึงนำสุนัขหานายคน
โลตันมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยเป็นจะไป
สุนัขกวนไม่ให้กินวัชชินบองกันโรคสุนัขบ้า
หรือโรคกลัวน้ำมาร่วมกันว่า สุนัขอาหาร
น้อยเข้าและกลางวันก่อนอาบน้ำ สุนัขกิน
ได้เป็นปกติ อาการไม่แสดงว่าครวญผิด
ปกติ เจ้าของเกรงจะเป็นข้อจังขอให้ดู
สุนัขสาเหตุการตายแต่ตรวจสอบก็ว่าย

การตรวจทราก ผิวสุนัขเริ่มขึ้นเป็น
ผื่นแดงแล้ว สุนัขไม่ยอมโโซ มีไข้ผันทั่วไป

อวัยวะทุกอย่างไม่แสดงผิดปกติ มากมาย
เกินธรรมชาติ.

ได้เบิกกระเพาะ เก็บ gastric content ได้
ประมาณ ๒๐๐ ซีซี ลักษณะ ข้น ปนมูก สี
คล้ำครึ่ง เฟอร์ราชา rotenone.

เบิกสมอง ตัดบริเวณ hippocampus ทำ
impression smear บน slides ๓ แผ่น รวม
จะสี ทรงสัน ๓๖ รอย บ้อมกับ Seller's stain ๑

ผล ๑. การตรวจตัวยังคงอยู่ทั้งน้ำ Nagri's bodies ไม่พบเลย.

๒. Gastric content ๑ ซีซี เมื่อเจือจาง
ก้อนน้ำน้ำครบที่ประมาณ ๒๐๐ ซีซี สามารถ
บ้วนออกได้ ๓ ตัว ทั้งๆ ที่กอนมากก็ขังคงอยู่
สัตวแพทยศาสตร์ได้ในเวลา ๒-๓ ชั่วโมง.

๓. การตรวจทางเคมี หา rotenone
โดยเชี่ยว แสงสักดิ์ตัวยชี chloroform แยก
น้ำยาที่ใช้สักดิ์ตัวยชี separating funnel แบ่ง
มาประมาณ ๕ ซีซี เติม ๑๐% thymol ใน
chloroform เท่ากัน เติม ๓ ซีซี ของกรดคิโน
บีรัสสิ-กรดเกลือ (๑ ใน ๔๐๐) ปรุงดู

การตายเนื่องจากพิษโลเด็นในสุนัข ๑ ราย

๖๘

ได้สืบเชิงปนสัน្ឋเงิน.²

โดยที่เรามีมีเครื่องเทียบสี (colorimeter) จึงไม่สามารถหาจำนวน rotenone ที่สันในกระเพาะกับ ผง rotenone ที่สักด้วยแล้วค่าวัดการเทียบสีได้.

โดยที่ตรวจพบ rotenone ตามผลที่ได้แสดงประกอบประวัติ มีไถ่แสดงบ่งไปในโรคสุนัขบ้า จึงมีได้ทำการฉีดสมอผ่านหูท่อไป เพื่อหาวิสัย rabies.

สรุป ประวัติที่บ่งว่า อายุโลเด็น ตายโดยเข้าชิน อาหารและน้ำกินได้ในวันที่ตาย ก็เป็นอาการสำคัญที่บ่งว่าไม่มีเนื้อบ้า เพราะ

สุนัขบ้าก่อนตายจะกลืนน้ำ และอาหารไม่ได้เนื่องจาก spasm of esophagus ประกอบกับ การตรวจพบ rotenone ทางเดิน และถูกทิ้งทางเกสรชีวิกายแก่ป่วยย้อมลงความเห็นได้ว่า สุนัขรายนี้ตายเพาะะโลเด็น.

เอกสาร

- Anonymous : Oxford Looseleaves : Rabies.
ด้วยความอนุเคราะห์ส่วนตัวจากนายแพทย์ สำเนียง บุญปัวพิช พม. สถานเสาวภา
- Martindale : Extra – pharmacopoeia 1943 vol. II 163-165.

สาเหตุการริบกันในลูกไก่และไก่ใหญ่ (Cannibalism) มีอยู่หลายประการ คือ

๑. จากสิ่งแวดล้อมทั่วๆ เช่น กรงแคบทึบเกินไป ใส่ไก่แน่น กรงต่ำมาก ไก่กระโ郭.

๒. มีเหาและไรมาก.

๓. ขาดมาตรฐานของอย่าง (เกลือ, แมงกาน់ส, โปรตีน).

วิธีแก้ ต้องแก้สาเหตุโดยขยายกรง กำจัดเหาและไร เพิ่มมาตรฐานของ นอกงานนี้ นาย Kull ยังได้รายงานว่า อาการทุคล่องเพิ่ม แมงกาน់สชัลเฟก และกระดูกบี้น ผสมไปในอาหารไก่ผลิตเม็นทพอยามาก.