

การเป็นอัมพาตหลังจากฉีดวัคซิโนโรคกลัวน้ำ

(Postvaccination Paralysis)

เมื่อสักวันป่วยได้ด้วยดงโดยบังเอิญ และเจ้าของสักวันได้ให้สักวัพเพทัยทำการตรวจรักษามาก่อน ก็มีจาระไปเรียนปรึกษาสักวัพเพทัยเสมอ เมื่อแจ้งอาการให้ทราบแล้วก็ได้รับทันท่วงที่ด้วยน้ำหรือไม่ หงส์ที่บางที่ขาดของตุนชักกูอกทำลายไปแล้ว เรื่องนักเป็นการลามากโดยยื่นตัวหรือดึงตัวเพทัยจะรีบดูไปว่าตุนชักเป็นน้ำหรือไม่ เพราะอาการที่ได้พังจากเจ้าของสักวัพเพทัยมากกันไม่ละเอียดพอ อาการสำคัญ ๆ ที่ทางสักวัพเพทัยต้องการทราบต่อเนื่องมา ก็เจ้าของอาจไม่รู้เกตุเห็น เพื่อเป็นการกันไว้ก่อนแก้ หากเจ้าของถูกตุนชักด้วยนักด้วยน้ำหรือมือเท่าน้ำดีและสังสัยว่าอาจถูกน้ำตายตุนชักในขณะป่วย ก็ควรจะไปฉีดยาบังกันเสีย แต่ทั้งนี้ได้แนะนำให้ไปหาเพทัยที่สถานพยาบาล เรียนปรึกษาเพทัยออกครัวหนึ่ง ก่อนจะฉีดยาทุกรายไป บางรายมีอ้อไปหาเพทัยทางเพทัยก็ลงความเห็นว่า ยังไม่ควรจะฉีด ก็ให้สักวัพเพทัยกราดตุนชักด้วยว่าเป็นตุนชักน้ำหรือเปล่า เพราะการฉีดวัคซิโนโรคกลัวน้ำทำให้เจ้าของตุนชักและสมองน้ำอาจทำให้ฟื้นป่วยแพ้วัคซินได้ แต่ในกรณียังเช่นนี้ หากตุนชักด้วยดงเป็นตุนชักจริง และเจ้าของได้รับเชื้อด้วยทางใดก็ตาม หากมีได้ฉีดยา หากอาการของโรคกลัวน้ำปรากฏว่าเกิดขึ้นกับผู้ป่วยแล้ว ไม่มีทางรักษาได้โดยชั่วบันว่าเป็นเรื่องที่น่าศร้าวอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซิโนโรคกลัวน้ำหากด้วยเนื้อของตุนของแต่ละไขตุนหลัง อาจทำให้ตุนหัวรับวัคซิโนโรคเกิดเป็นอัมพาตไปทั้งตัว หรือกด้านเนื้อส่วนหนึ่งส่วนใดได้ เรียกว่า Postvaccinal Paralysis แต่การเป็นอัมพาตหลังฉีดวัคซิโนโรคกลัวน้ำเนื่องจากเป็นตุนอัษฎางค์ในตัวก็แต่กัน จากรายงานในหนังสือโรคคิดค่อในสักว่า ชั่วเรี่ยบเรียงโดย Dr. William Arthur Hagan กล่าวว่ามีรายเดียวเท่านั้นจากนั้นก็หายไปแล้วทั้งตัว ทั้งนกน ส่วนในประเทศไทย การแพ้วัคซิโนโรคกลัวน้ำที่แสดงอาการแบบ Postvaccinal Paralysis เท่าทั้งัวพเจ้าทราบก็เพิ่มรายเดียว ชั่วเรี่ยบเรียงนั้นในปัจจุบัน (ขอตั้งนานาน) อุบัติจังหวัดนครศรีธรรมราชคือเมืองทันเดือนกรกฎาคม ศกน ตุนชักได้ด้วยดง และได้ไปหาชัวพเจ้า หลังจากเด่าอาการตุนชัก

การเป็นอัมพาตหลังจากนี่คือก็ชินโรคกลัวน้ำ

ภายในข้าพเจ้าพังแล้ว ก็ได้เบิดแผลที่ถูกสูญเสียก็ที่ขาให้ดูด้วย จากอาการดูน้ำว่าที่ได้รับทราบจากเจ้าของ แต่สูญเสียหัวนมเคยมีดีก็ชินบังกันโรคกลัวน้ำมาก่อน ข้าพเจ้าดูความเห็นว่าสูญเสียเป็นมาได้ แต่การตรวจที่แน่นอนจะต้องนำต้มงาไปให้สถานเดียวภาครือกรมปศุสัตว์กรุงเทพฯ ตรวจดึงจะทราบได้แน่นอน ต่อไปจะนี้คือยาหรือไม่นะ ให้ไปเรียนปรึกษาแพทย์แก่ในความเห็นส่วนตัวข้าพเจ้าว่าควรจะได้ดี ทางแพทย์ก็ดูความเห็นว่าควรดี เนื่องบ่อยว่าก็ชินไปได้ประมาณเข็มที่ ๑๐ ก็ให้มือการยกมือยกเท้าไม่ขึ้น เดินไม่ได้อาทีเดียว ระบบการรับถ่ายเสี่ยไป เพราะถ้ามันเนื่องแห่งเป็นอัมพาตหมด ร่างกายเกิดื่องไขวนได้ ในกรณีอาจจะเป็นแบบอัมพาตถาวร (Permanent paralysis) หรืออัมพาตชั่วคราว (Temporary paralysis or perosis) แต่ในการนี้หดตัวก็อย่างไรการรักษาเป็นเวลานาน การแพ้แบบนี้เกิดขึ้นในสัณหามากกว่าในคน ชั่วแค่เวลาในสัณหามากกว่าการที่เกิดไม่รุนแรง เป็นอย่างอ่อนและช้า ควรหานาน คงแรกเมื่อ Pasteur vaccine ใช้อยู่ที่ๆไป เข้าใจกันว่าการแพ้เนื่องจากเชื้อ virus ในวัคซีน แต่เดียวนี้เชื่อกันทว่าไปว่า การแพ้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการแพ้ภายนรรณชาติ (An allergic nature) แก่ส่วนประภูมิของเนื้อเยื่อประสาท (Nerve Tissues) ที่มีดีก็ชินนั้น

แม้ว่าปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นในสัตว์อย่างอ่อนและช้ากว่าคนตาม แต่บางรายอาจมีผลให้ชื้อช่วงบางส่วนพิการไปตลอดกาลได้ โดยทั่วไปอาการมักปรากฏหลังจากฉีดวัคซีนในวันที่๒๕ ถ้วงแล้ว หรืออาจช้ากว่านั้น การเป็นอัมพาตอาจเกียจช้อปเนาะกัด้านเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็ได้ ส่วนมากมักจะเป็นอัมพาตกันอยู่ระหว่างส่วนปลายในบริเวณที่ฉีดวัคซีน บางครั้งการเป็นอัมพาตจะหายตัวออกไปทุกส่วนของร่างกาย แต่หายในที่สุด อาการที่เกิดขึ้นเป็นผลเนื่องจากภาระที่เกิดขึ้นในส่วนของสมอง หรือไขสันหลังหรือทั้งสองอย่างรวมกัน กล่าวกันว่าดีก็ชินไปก็ต้องหากัดขาดจากไข่ไก่ทำให้เกิดเป็นอัมพาทดังจ้าวฉีดวัคซีนแล้ว เมื่อทราบว่าการฉีดวัคซีนโรคกลัวน้ำทำจาก Nerve Tissues ไม่ว่าในกันหรือสัตว์ย่อมเป็นการเสี่ยงอันตราย เกิดขึ้นชุ่นช่วงควรปฏิบัติดังนี้

๑) สูญเสีย ควรรีบแจ้งให้ดูแพทย์ทราบ หรือนำไปให้ครัวรักษาเสี่ยดังแต่เดิม ก็ชิน เพราหากสังสัยว่ามีอาการจะเดี่ยวไปในทางเป็นมาแล้ว ก็จะได้ให้เจ้าของกักจุ่งไว้ดูอาการต่อไป และย้อมเป็นการปิดอยู่กับเจ้าของที่จะได้ ระมัดระวัง ไม่กดูกดกับสูญเสีย

- ๒) เมื่อถูกสุนัขกัดโดยเจตนา หากจับสุนัขชั่งไว้ได้ก็ควรกระทำอย่างด่วนให้วิง
หายไปเฉย ๆ หรือทำด้วยเตี้ยโดยทันที ทั้งนี้เพื่อการตรวจวินิจฉัยอาการของสุนัขด่วน
๓) หากสุนัขตายดัง การนำร่มของแต่น้ำตายไปให้สถาบันที่สามารถตรวจโรคพิษ
สุนัขบ้าครรภ่าได้เป็นการตี เพื่อยืนยันให้แน่นอน
๔) เมื่อเดียงสุนัข ควรนำไปฉีดบังกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย ครั้ง จะทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

สรุป

การฉีดวัคซีนโรคกลัวน้ำที่ทำด้วยเนื้อเยื่อประสาท (Nerve Tissues) อาจทำให้เกิด^{ชั่วคราว}
เป็นอันพาหะส่วนหนึ่งส่วนใดให้ริบเป็นอันพาหะทั้งตัวและถึงแก่ชีวิต ทั้งในสัตว์เดะกันได้ อาการ
จะเกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนวันที่ & หรือซักกว่าหนึ่ง ส่วนวัคซีนโรคกลัวน้ำที่ทำจากไข่ไก่ไม่ทำ
ให้เกิดการแพ้แบบนี้

อุทิศ มูลโลก
หัวหน้าสถานีควบคุมโรคสัตว์ จ.ว. นครศรีธรรมราช