

การเจาะช่องหัวข้องลูกตา^{ชั้น} (Paracentesis of the Anterior Chamber)

โดย แดง กานุจnarayan พ.ด.

การผ่าตัดนี้ มีความประสังค์เพื่อจะเจาะ
อากาศในช่องหัวข้องลูกตาออก ซึ่งบางที่
อาจมีเมล็ดคราบหรือหนองปนอยู่ และบาง
ครั้งอาจมีทารเพอเอากวัพยาธิออกก็ได้.

เครื่องมือ

๑. ป้ำกคิบ (Fixation forceps).
๒. เครื่องถ่างตา (Eye Speculum).
๓. ผิค (Keratome).

วิธีท่า

เมื่อได้ใช้ยาชาหมดด้านตาซ้ายแล้ว (จะรู้ได้ว่าตาชา โดยเข้าป้ำกคิบเข้าที่ conjunctiva หรือเข้าล้ำลึก แพทย์ cornea ถ้าตาชาถูกทางไม่รู้เรียว).

ใช้ล้างตาด้วยน้ำบริโภค๓% อุ่นๆ เพื่อ
แล้วใส่เครื่องถ่างตา ต่อไปใช้ป้ำกคิบเข้า
ตรงตาชาที่อยู่ต่ำๆ (limbus) และที่รับ
ควรขึ้นลงกันขึ้นกันๆ จะเจาะเข้าไป ใช้
keratome แหงลงไปตรง cornea ต่อ กับ
Sclera การแหงนต้องแหงเฉลียง เพราะ
ของกันไม่ให้ป้ำยแพลมชิง keratome
ลงไปแหง虹膜 iris หรือ lens ซึ่งจะทำให้เกิด
iritis หรือเกิด traumatic cataract ได้ เมื่อ
เห็นป้ำย keratome โผล่ใน anterior

chamber แล้วท้องอกคัม keratome ลงให้
ถูก เพื่อให้ป้ำยแพลมของ keratome นาน
กับ iris ที่มาค่อยๆ คัน keratome เช่นไร
ให้แลกกว้างตามความต้องการ แล้วจึง
กึงเอา keratome ออก การกึงเอา keratome
ออกนั้น ถ้าต้องการให้น้ำไหลออกมากๆ
ก็ควรค่อยๆ คั่งออกช้าๆ ถ้าไม่ต้องการให้
น้ำไหลออกมาก ควรจะคงออกโดยเร็ว
เป็นเสร็จการผ่าตัดเจาะช่องหัวข้องลูกตา.

การทำผ่าตัดเจาะช่องหัวข้องลูกตา^{ชั้น}
ควรใช้ keratome ที่คุณ มีระดับเวลาทักน
แรงๆ keratome ทักษ อาจ ทะลุเข้าไปโดย
แรง จะทำอันตรายแก่ iris หรือ lens ได้.

เมื่อท่าทำ paracentesis ชิง anterior
chamber แล้วถ้าต้องการจะเอารสังขของกอน
ใน anterior chamber ออกมาน ให้ทำไก่โดย

๑. ใช้ป้ำกคิบเข้าไปขึ้นคั่งออกมาน.
๒. ใช้ล้าง anterior chamber ด้วย
normal saline โดยใช้ canula ที่ทำพิเศษ
ที่อยู่สายยางที่ต่อมาจาก undine สำหรับ
ใช้ล้างตา ค่อยๆ ล้างจนสิ้นท้องการนั้น
ออกมาน และท้องระวังอย่าให้ป้ำย canula
ถูก lens ทิ้ง.