

เรื่องย่อ (ABSTRACTS)

โดย อายุต พิชัยชาญวงศ์

การรักษาโรคเท้าและปากเบื้องด้วยยา จำ

พุก Sulphonamides

Scholl-Latour, O. (1949)

Dtsch. tierarztl. Wschr. 53. 88-91 (V. B. v. 19 no. 2)

ยา Sulphonamides ชนิด ม Marfanil (4 amino methyl benzene sulphonamide), Marfanil B, Prontalbin และ Eleudron (Sulpha thiazole) ผลิตอย่างดีเท่านั้น ใช้รักษาวัว ตัว สุกร ตัว ลูก สุกร ๑๐ ตัว แกะ ๔ ตัว ที่เป็นโรคเท้าและปากเบื้อง โดยโรคแพดและให้กินประกาย ว่าหายได้ขาดแต่รากเดียว บางรายมีคุณทั้งหมด ในแตกแต่งแห้งไป จึงคิดว่ายา จำพวก Sulphonamides ไม่เพียงแค่หายรากเท่านั้น ยังหายรากและรากหัวของโรคเท้าและปากเบื้องโดยตรงด้วย

ความทนทานว่าสานแห้งของโรคไก่ต่างๆ Beaudette, F.R.; Miller, B.R.; Bivins, J.A. & Hudson, C.B. (1948) J.A.V.R. 9. 190-194

หลังจากปดูกรว่าในไข่แดง ได้ทำให้แห้งแต่เก็บไว้ในเครื่องดูดความชื้น อุณหภูมิอยู่ที่เย็น เมื่อนำมาตรวจสอบความแห้ง

ทันทีสานแห้งของโรคไก่แต่ละชนิดเป็นระยะ ๆ ไป ปรากฏว่า

วิถีโรคคิดว่าเดี่ยวแต่ลดลงตามไปเรื่อยๆ เส้น พากแรมช่วงนานถึง ๓๓๕๘ วัน พากหดันนานเพียง ๔๙๗ วัน

วิถีโรคคิดว่าเดี่ยว มีช่วงนานถึง ๓๕๘ วัน
วิถีโรคคิดว่าเดี่ยวพัดตาม “ ” ๖๖๐๘ “ ”
วิถีโรคคิดว่าเดี่ยวครึบ “ ” ๖๕๗ “ ”
วิถีโรคคิดว่าเดี่ยว “ ” ๑๔๙ “ ”
วิถีโรคคิดว่าเดี่ยว “ ” ๑๔๙ “ ”
วิถีโรคชันงัดดอนอักเสบ มีช่วงนานถึง ๒๘๖ วัน

วิถีโรคคิดว่าเดี่ยวชันงัดดอนอักเสบอีก ๑ ชนิด มีช่วงนานกว่า ๓๐๐ วัน

อัตราตายเฉลี่ยของโรค Newcastle ในไก Jungherr, E. (1948) J.A.V.M.A. 112. 124-125

ดูกรไก่ ๔๗,๓๗๕ ตัว อายุ ๑-๓๕ วัน
ตาย ๑๓.๔%
ไก่ ๔๗,๖๐๐ “ ” , ๔๗-๑๙๐ “ ”
ตาย ๕.๙%

ไก่ ๔๗,๖๐ ตัว อายุ ๑๕๐-๔๖๐ วัน
ตาย ๑.๔% พากสุกท้าย ไอกดก้านวนน้อย
ลงจากปรกติถึง ๙๐%

โรคผื่นเม็ดตุ่มตามผิวนังท่างวีสา
(Virus papular dermatitis)

A.J.V.R. 10 229-232

McIntyre, R.W. (1949)

McIntyre ได้ตรวจมาที่เป็นผื่นเม็ดตามผิวนัง โดยใช้ผิวนังมาตรฐานๆ ทางเชื้อรา และพยาธิภายในอก กระดูกฯลฯ และโดยที่ก็ไม่พบอะไร.

ได้ลองด้วยผิวนังที่รู้สึก และแยกจากเด็ก ควยนาเกตดอยร่อง เชือบกันเครื่นปราศจากเชื้อ แต่พยาธิในปดูกับเนื้อในใช้และน้ำผ่านหนักมาก หนูตะเภา และกระต่าย ปราศ

ไว้ไข้คายใน 4 วัน ส่วนเด็กที่ทดลองเป็นปกติ การปดูกเตียงในไว้ค่อนไปทำให้ไข้คายเรื้อร้า นำเยื่อไข้คายมาดูดูแล้วดามเนื้อเจ้า

ได้ผิวนังและชุดบนผิวนังอย่างตัวปราศจากความว่าทุกตัว เกิดมีผื่นเม็ดตุ่มตามผิวนังให้รู้สึกบนผิวนังท่าให้เกิดผื่นไคร้กดเร็วๆ กว่า

โรคผื่นเม็ดตุ่มตามผิวนัง ทางเดินเป็น

โรคทับใหม่ครั้งแรก รายละเอียดของพศตัวทางโรค นัยนักดังสูบส่วนคนคว้าจัย ท่อไปยัง ผู้ต้นไอยาจจะได้พบในนิตยสารต่างประเทศค่อนไป