

# เบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับเบ็ด

พลา จันทวานิช

เบ็ดกะเทย เบ็ดกะเทยเกิดจากเดิมที่เป็นตัวเมีย และตอนหลังกลดบังกลายเป็นกะเทย โดยการที่เบ็ดตัวนั้นค่อย ๆ เปลี่ยนจาก ดีแต่ละลักษณะ ของตัวเมีย เป็นดีแต่ละ ลักษณะ ของตัวผู้ มีทางอนชน ๒-๓ เส้นเหมือนตัวผู้ และมีเตียงแหบเหมือนตัวผู้

สาเหตุที่ทำให้เบ็ดกลายเป็นกะเทย เท่าที่ทราบ คือ

๑. เนื่องจากเปลี่ยนคุณภาพของอาหารจากดีเป็นเลวโดยกระทันหัน ทำให้ส่วนของอาหารที่จะไปผลิตไข่ไม่พอ เบ็ดจึงเริ่มไข่น้อยไปจนถึงไม่ไข่เลย และโดยเหตุนี้เอง ฮอโมนของตัวผู้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเพียงเล็กน้อยแต่แรกเกิดกลดบังเจริญขึ้น ๆ จนกระทั่งกลายเป็นกะเทย

๒. เนื่องจากโรคบางชนิด เข้าไปทำให้รังไข่ของเบ็ดตัวนั้น ๆ เสื่อมในการผลิตไข่ จนกระทั่งไม่ไข่ และในขณะนั้นฮอโมนของตัวผู้ที่มีประจำตัวอยู่บ้าง กลดบังค่อย ๆ เจริญขึ้น ๆ จนกลายเป็นกะเทย

การผสมเบ็ดในน้ำ การผสมเบ็ดที่มีน้ำ (บ่อ, คู, อ่าง) ดีกว่าผสมบนบก คือ:-

๑. เมื่อเบ็ดได้อาบน้ำต่างตัว เป็นธรรมชาติเบ็ดนั้นจะเกิดสบายตัว สบายใจ จึงจะผสมบอยช่น
๒. เบ็ดจะไม่ค่อยรังแกกันเองในระหว่างทำการผสม
๓. ผสมได้รวดเร็ว ไม่ชักช้า
๔. เครื่องเพศของตัวผู้จะหดเข้าตัวที่เดิมรวดเร็ว ไม่ค่อยชอกช้ำ และไม่ติดโรค

วิธีวาง

๕. ตามธรรมชาติเบ็ดถือว่าเป็นนกน้ำ เมื่อน้ำแห้งตามส่งบายแล้ว เบ็ดจะแข็งแรงของใจ และว่าเริงตลอด ทำให้ไม่ค่อยเป็นโรคและสะดวกต่อการใช้ผสมพันธุ์

๖. ใช้ตัวผู้ลดลงเหลือเพียง ๕-๖ ตัวต่อตัวเมีย ๓๐๐ ตัว ซึ่งถ้าเตียงมากจะต้องใช้ ๓๐-๓๕ ตัวต่อตัวเมีย ๓๐๐ ตัว (ผู้กำกับแคมเบดด์)

น้ำ ต้องไม่เค็มหรือกร่อย เพราะเบ็ดไม่ชอบเค็ม ถ้าเค็มมากเบ็ดจะตาย และถ้ากร่อยเบ็ดอาจพ่อยได้ แต่การผสมพันธุ์จะไม่ได้ (เปอร์เซ็นต์ต่ำ)